<u>annakan attoriakan jamanlariadan jalantud</u> himmalinati<mark>ralasataskipum hautiishisit</mark>iir

Inconnu noir de Tordères

0MTP528

INA SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R03s121-125 0Mtp528

The Boundary of January &

FH

2 Rg 3 s 121.125 Tucomme de Tordoris q









NOM bronnu de Torderes 9 EMPLACEMENT & R3 121. 125

ni

Socore	Nbre yeux	Débou début	rrement.	grap	lité	Flor	mi/f	fin	début			Maturité
1 ? 3	4 5 2	23.3	19.5 x 26.3 x 26.3 x 26.3	3	Grappe Pour: Baie: Couler Saveur	TC - (disc - 6 ir : B-	M- P Mil G- M ph-cli Gr-Rs- m - a	Dim 1 Dim 1 Div-o 1 Div-o 1 Div-o 1 Div-o	:13 Dim:19 bov-cy Jus fox - h	Compa W 1-fus : inc erb	cité	145 : (I) - (M) C

2 R34-121.125 NOM Grionne de EMPLACEMENT PO1.85. torderes q Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti- Floraison Véraison lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 253 253× 8 253 253× 6 223 253× 9 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : 2,5

AMMEE: 1996

110M Ynconne de Tordéres

EMPLACEPENT, 2 R 3 A 4 2 1. 125

PO 1.85.												
ouche	yeux	debut	rrement mi/déb	grap	Ferti- lité	- Floraison debut mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Haturité
1 2 3 4 5	4	M 3	183. 183. 183. 183. 3.96(+2)	7 8	Pour : Baie : Coulet Saveur	TC - disc-s r : B-	M - P MII G - U ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P 1-ov-o -Rg-N ar - f oyrène	Dim: bov-cy dus ox - h	Compa 1-fus : inc erb	<u>cité</u>	: L - 11- C

Theorem de Torderes 9

Floraison 2 R3 p 121 - 125 | 6.6.96 (+7)

greame de Fordores q N° d'ordre : 2 R30, 121-125A-3 Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 1/82/- moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/78 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280) - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 203 - Jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 2(18) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237)duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 89

Incomme de Fordores 9 2 Rg 3 s. 121-125 0-1

Nº d'ordre : Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtele. Glabre 242)- à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251) - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254) - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre coloré 257) - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263 Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: colore 264 / vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 89

Incomme de Fordores que 2 Rg 3 s. 121-125 s. 2

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -

sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures: Face supérieure: verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert fonce - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

. Calvos9

N° d'ordre :

Mucamu de Fordores 9 2R30,121-125A-3

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 1/82 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES OU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 89

Muconne de Fordores 7 2 Rg 30-121-125-3 N° d'ordre : Désignation : Emplacement : GRAPPE Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 45x). Lâche 71 - Moyenne 72) - Compacte 73.) A pédoncule non visible 74 - visible 75 /- long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1.) Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 86 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière (dimensions 45 x 14). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir (1) Très pruinée (2)- pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 67 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 / coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1/17) A saveur neutre 1(2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121) A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127

A pulpe charnue 138 - juteuse 179 - molle 140 - peu juteuse.

A bourrelet évident 128 peu apparent 129.

A pinceau : court 130 moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 non coloré 134.

A peau fine 1/35) - moyenne 136 - épaisse 137.

Avec pepins - apyrène.

-Calvo89

N° d'ordre : Jnconnu de Torderes Emplacement : 2 R 3 s 121. 125

Angle des nervures Sexe L1/L : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 19 - 15 - 16 Nombre de lobes $\begin{array}{c} : 17 - 18 - 19 - 20 \\ : 21 - 22 - 23 - 24 \\ : 25 - 26 - 27 - 28 \cdot 79 \end{array}$ Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - (5) - (6) - (37) - 38 - (39) Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autr : 270 : (27) Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : (45) - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 67 67 - 9- 59 Nbre dents du point pét. à L3 : 60 - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - (64) - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiglies